



ville-thiais.fr



generationsjardins.com



guêpe
frelon
abeille ?

guêpe frelon abeille ?



Il s'agit bien de trois insectes volants, de couleurs rayées, qui ont un dard pour piquer. Toutefois, ils n'ont pas tous le même comportement, ni le même rôle. Il est important de les différencier avant de les éliminer.

En effet, les abeilles font partie d'une catégorie protégée d'insectes. Depuis plusieurs années, les spécialistes ont noté une diminution marquée de leur population globale. Celles-ci sont pourtant essentielles pour la production de miel et la pollinisation.

Il est donc essentiel de savoir quel type d'insecte nous cause des soucis avant de détruire un nid : c'est surtout par leur apparence et leur taille que ces insectes se distinguent.

L'ABEILLE DOMESTIQUE

(*Apis mellifera*)

L'abeille est en général la plus petite des trois et possède un corps beaucoup plus trapu et velu que les guêpes et les frelons.

Vous avez affaire à une abeille si :

- Elle est plutôt petite : 12 mm pour une ouvrière, 16 à 20 mm pour la reine. Le mâle (le faux bourdon) mesure de 15 à 16 mm.

- Son corps est plutôt poilu et trapu.

- Elle butine les fleurs et non pas dans votre assiette.

À NOTER

Certaines personnes peuvent être allergiques au venin de ces insectes. Ces réactions allergiques comprennent : gonflement de la langue, des lèvres, de la gorge ou des yeux, difficulté à respirer ou avaler, étourdissements ou malaises, nausées, vomissements, éruption cutanée, fièvre.

Si vous constatez un de ces symptômes après avoir été piqué par un insecte, consultez alors immédiatement un médecin.

À moins d'être apiculteur ou de vivre près d'une ruche d'abeilles, le risque de vous retrouver nez à nez avec cette butineuse est faible.

En effet, au printemps, elle ne s'aventure généralement pas plus loin qu'à une distance d'environ 500 mètres de sa colonie pour récolter le pollen,

sa principale source de nourriture. Lorsque les fleurs se font plus rares à l'approche de l'automne, elle peut parcourir jusqu'à 5 km pour s'alimenter.

En général, l'abeille n'est pas agressive, sauf si elle se sent menacée. Elle utilisera donc son dard pour piquer et injecter son venin, mais une seule fois... car elle mourra ensuite.

Les piqûres d'abeilles sont douloureuses et entraînent rougeur ou boursoufflement sur la zone piquée. Ces symptômes durent environ 48 heures et doivent être surveillés en cas d'allergie.



LA GUÊPE (genre *Vespula*)

3 castes chez les guêpes : reine, ouvrières et mâles.

Vous avez probablement affaire à une guêpe si :

- Elle mesure au moins 10 mm, jusqu'à 25 mm pour la reine.
- Elle n'a pratiquement aucun poil et arbore des bandes jaune vif et noir sur son abdomen.
- Son abdomen est long et élancé, avec une taille marquée entre l'abdomen et le thorax.

- Elle butine non seulement les fleurs, mais aussi toute autre source de sucre, de gras ou de protéine. Elle ira sans hésitation fureter dans votre assiette ou vos poubelles.

Contrairement aux abeilles, les guêpes se nourrissent en plus de protéines animales, qu'elles rapportent aussi au nid pour nourrir les larves. Les guêpes se nourrissent elles-mêmes de presque n'importe quel aliment sucré ou en décomposition. La nourriture et les ordures des humains les attirent donc énormément. C'est pourquoi elles nous rendent souvent visite lors de nos pique-niques d'été. Lorsqu'elles virevoltent lentement autour de notre table, elles sont justement en train de tenter de repérer la source exacte d'une odeur qui les a attirées.

Quelqu'un qui s'approche brusquement du nid de guêpes, qui le frappe ou pose le pied dessus, sera vu comme un envahisseur qu'il faut éloigner à tout prix. Les gestes brusques les énervent plus qu'autre chose. Alors, prudence !

Les effets d'une piqûre de guêpe sont très semblables à ceux d'une piqûre d'abeille ; les personnes allergiques doivent faire preuve d'une grande prudence. Notez qu'une guêpe peut piquer plusieurs fois.

Il est toujours possible de les éloigner en installant des plants de lavande, de citronnelle ou de géraniums odorants autour de votre terrasse.

LE FRELON ASIATIQUE A PATTES JAUNES (*Vespa velutina nigrithogax*)

Son expansion est continue sur le territoire français. On peut limiter sa présence en zone urbaine en respectant une bonne pratique de destruction des nids.

Vous êtes en présence d'un frelon asiatique à pattes jaunes si :

- Sa face est orangée.
- Il présente un abdomen noir avec une large bande orangée.
- Les extrémités de ses pattes ont de couleur jaune.

Le frelon asiatique est actif le jour et dort la nuit. Son nid est fermé avec une entrée latérale. Ces frelons vont exercer une pression croissante sur les ruchers pour capturer les butineuses chargées de pollen et de nectar à leur retour.



Ils les découpent pour ne conserver que leur thorax dont ils font une boulette qu'ils rapportent au nid.

En cas de piqûre par un frelon asiatique :

- Retirer tout de suite bagues et bracelets,
- Approcher une source de chaleur à 1,5 cm de la piqûre (venin thermolabile),
- Appliquer de la glace ou une crème anti-inflammatoire,
- Prendre un antihistaminique,
- Appeler le 15 ou le 18 sans attendre ou se rendre aux urgences si vous constatez des symptômes anormaux.

Le frelon asiatique

Les confusions possibles



Abeille



Guêpe



Frelon Asiatique



Frelon Européen

